



FICHA TÉCNICA

AURAL P+K®

SOLUCIÓN CONCENTRADA A BASE DE FOSFITO POTÁSICO

AURAL P+K es un fertilizante rico en fósforo y potasio, en forma de ión fosfito potásico, que permite dar vigor a los cultivos tratados, frente a los daños causados por las enfermedades originadas por los hongos especialmente fomicetos del tipo *Pythium spp*, *Peronospora spp*, *Phytophthora spp*, *Plasmopara spp*, etc, estimulando la síntesis de defensas naturales en los cultivos a través de la inducción de fitoalexinas.

Los cultivos tratados con AURAL P+K, son capaces de superar periodos de estrés ambiental y nutricional, gracias a la acción combinada del ión fosfito y al aumento del contenido de fósforo y potasio en la planta, fortaleciendo raíces y tallos, además de favorecer la absorción de cationes como K, Ca, Mg, Mn.

Composición

	RIQUEZA (%p/p)	RIQUEZA (%p/v)
Fósforo (P ₂ O ₅)	12.00	60.00
Potasio (K ₂ O)	20.00	30.00

Características Físico-Químicas

Apariencia: Líquido denso transparente pH: 3 Densidad: 1.48 g/cc

Compatibilidad

AURAL P+K mezcla con la mayoría de productos fitosanitarios, sin embargo, recomendamos realizar pruebas previas a la aplicación a nivel de campo. No mezclar con productos a base de Calcio, Cobre, Azufres, Caldo Bordelés, Aceites, Dicofol, Dimetoato, Dinocap, productos de alta reacción ácida ó alcalina, productos peroxiacéticos ni hipocloritos.





FICHA TÉCNICA

Fitotoxicidad

AURAL P+K no presenta ningún tipo de fitotoxicidad, al aplicarlo siguiendo las indicaciones de este folleto.

Almacenamiento

AURAL P+K debe ser conservado bajo un ambiente fresco y seco. Evitar temperaturas extremas.

Recomendaciones de Uso

CULTIVO	DOSIS	RECOMENDACIONES
Manzano, Peral, Melocotón, Damasco, Cerezo, Vid, Nogal, Almendro, Avellano, Granado, Paltos, Kiwi, Limones, Naranjos, Mandarinos, Pomelos, Tángelos, Clementinas	300 – 400 cc/Hl 3 – 6 L/Ha	Realizar un mínimo de 4 aplicaciones, comenzando con la brotación y repetir 3 – 4 veces cada 10 – 14 días. Recomendamos realizar una aplicación en postcosecha para estimular el crecimiento radicular. Incrementar para paltos.
Arándano, Frambuesa, Fresa, Mora , Grosella (Berries)	400 cc/Hl 3 – 5 L/Ha	Aplicar desde inicio de la brotación, 3 a 4 aplicaciones cada 10 – 15 días. Realizar una aplicación en postcosecha para estimular crecimiento radicular.
Lechuga, Endibia, Repollo, Apio, Achicoria, Brócoli, Coliflor, Zanahoria, Alcachofas, Pepinos, Melones, Sandias, Tomate, Pimiento, Berenjena, Ají, Zapallo, Poroto verde, Betarraga, Poroto.	400 cc/Hl 3 – 5 L/Ha	Comenzar las aplicaciones 2 semanas después del trasplante, realizando un mínimo de 3 a 6 aplicaciones a intervalos de cada 7 – 10 días entre ellas.
Arroz, Trigo, Avena, Praderas, Ornamentales y Cebada	300 cc/Hl 3 – 5 L/Ha	Comenzar las aplicaciones 2 semanas después del trasplante, recomendamos aplicar cada 20 – 25 días, con un mínimo de aplicaciones según necesidad.

**Si su cultivo no se encuentra en esta tabla, solicite sus recomendaciones a nuestro departamento Técnico.*